

กองสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
เลขที่รับ 4340
วันที่ - ๖ ธ.ค. ๒๕๖๗ เวลา 10.48 น.



องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เลขที่รับ 10693
วันที่ - 6 ธ.ค. 2567 เวลา 9:57 น.

ที่ ตก ๐๐๒๓.๖/ว ๑๓๓๐

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก ถนนมหาชาติไทยบำรุง
ตาก ๖๓๐๐๐

๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แนวทางปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคไอกรน (กรณีพบผู้ป่วยสงสัยหรือมีการระบาดของไอกรน)
เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก นายกเทศมนตรีนครแม่สอด
และนายกเทศมนตรีเมืองตาก

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๔.๓/ว ๕๑๑๓
ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งว่าโรคไอกรนเป็นหนึ่งในโรคป้องกันด้วยวัคซีน และเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจที่พบบ่อยในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า ๑ ปี จากข้อมูลระบาดวิทยาของโรคไอกรนในปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ พบว่าแนวโน้มของผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ ซึ่งเป็นโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้รับ หรือได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของโรคไอกรนไม่ครบถ้วน รวมถึงพื้นที่ที่มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของไอกรน (DTP-HB-Hib/DTP) ต่ำ มีแนวโน้มจะเกิดการระบาดของโรคไอกรนได้ในอนาคต

ในการนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงขอประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคไอกรน (กรณีพบผู้ป่วยสงสัยหรือมีการระบาดของไอกรน) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๔๐ ๓๑๔๖ - ๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย


จึงเรียนมาเพื่อทราบ สำหรับอำเภอให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

อภิพร

(นางศรีทอง สายโรจน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดตาก



สจด.ตาก
 เลขที่รับ 10659
 วันที่.....
 วันที่ 25.07.2567
 กง.บป.
 เลขที่ 453
 วันที่ 3 5.ก. 25

ที่ มท ๐๘๓๙.๓/ว เชียงคาน

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า กระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่า โรคโอมิครอนเป็นหนึ่งในโรคป้องกันด้วยวัคซีน และเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจที่พบบ่อยในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า ๑ ปี จากข้อมูลระบาดวิทยาของโรคโอมิครอนในปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ พบว่าแนวโน้มของผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ ซึ่งเป็นโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้รับ หรือได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของโรคโอมิครอนไม่ครบถ้วน รวมถึงพื้นที่ที่มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของโอมิครอน (DTP-HB-Hib/ DTP) ต่ำ มีแนวโน้มจะเกิดการระบาดของโรคโอมิครอนได้ในอนาคต

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบแนวปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคโอมิครอน (กรณีพบผู้ป่วยสงสัยหรือมีการระบาดของโอมิครอน) มีความถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๙๐ ๓๑๙๖ - ๗ และดาวน์โหลดสิ่งส่งมาด้วยได้ที่เว็บไซต์ <https://www.shorturlasia/DWUNO> หรือ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้



กองสาธารณสุขท้องถิ่น
 กลุ่มงานป้องกันโรค
 โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๔๐๖
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th
 ผู้ประสานงาน นางสาวรัตนภรณ์ สองแก้ว
 นางสาวสุภาภาณี ช่วยเทศ




โรคไคกรน

มีนระบาดถึงมือ



“โรคไคกรน”

ติดต่อโดยการ ไอ จาม รดกันโดยตรงพบได้บ่อย
ในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี หรือการกตังแต่เดือนแรก



อาการ

มีอาการคล้ายเป็นหวัด ไอแห้งๆ นานกว่า 10 วัน
ต่อมาจะมีอาการไคถี่ๆ ติดต่อกัน 5-10 ครั้ง
ตามด้วยการหายใจเข้าอย่างแรงจนเกิดเสียงวูบ
ตาแดง มีน้ำมูกเด็กเล็กอาจหายใจไม่ทันจนหน้าเขียวได้

การป้องกัน

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไคกรนในเด็ก
อายุน้อยกว่า 6 ปี จำนวน 4-5 ครั้ง

ครั้งที่ 1 เริ่มเมื่ออายุ 2 เดือน


ครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 4 เดือน

ครั้งที่ 3 เมื่ออายุ 6 เดือน

ครั้งที่ 4 เมื่ออายุ 18 เดือน

ครั้งที่ 5 ฉีดวัคซีนกระตุ้น
เมื่ออายุ 4 ปี

การรักษา

- ✚ พักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำอุ่น 
- ✚ สวมหน้ากากอนามัย
- ✚ หลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมชน
- ✚ หลีกเลี่ยงสาเหตุที่ทำให้ไคมากขึ้น เช่นๆ การออกกำลังกาย ฝุ่นละออง ฯ
- ✚ หากไคติดต่อกันเกิน 10 วัน หรือ ไคติดกันเป็นชุด ควรรีบไปพบแพทย์

